



Stand der Information: Februar 2009 / Art. Nr.: 2-6001

Patienteninformation

# Onyster® Nagelset

Pflaster und Salbe



## Liebe Patientin! Lieber Patient!

Ihre Ärztin / Ihr Arzt hat bei Ihnen eine Pilzkrankung an den Fußnägeln festgestellt und Ihnen daher das Onyster® Nagelset verordnet.

Diese Informationsbroschüre soll Ihnen wichtige Hinweise für die Verwendung von Onyster® geben.

### Woraus besteht das Onyster® Nagelset?

Das Onyster® Nagelset besteht aus:

- **21 wasserfesten Pflastern**, die ergonomisch geformt sind um am Nagel bzw. der Zehe optimal zu halten.
- **10 g Salbe**

### Wie wirkt Onyster®?

Ziel der Behandlung mit Onyster® ist es, den erkrankten (pilzbefallenen) Teil des Nagels aufzuweichen, sodass der Nagel leicht abgeschnitten bzw. entfernt werden kann.

Die Salbe enthält 40% Urea (Harnstoff), der keratolytisch (ablösend) wirkt. Dadurch weicht Onyster® gezielt den erkrankten Teil des Nagels an den Stellen auf, die ihm Halt im Nagelbett geben. Das gesunde Keratin (Hornsubstanz) des Nagels bleibt dabei jedoch erhalten.

Das Pflaster schließt die Salbe luftdicht mit dem Nagel ab (Okklusivverband) damit der enthaltene Harnstoff optimal wirken kann. Durch die besondere Beschaffenheit des Pflasters bleibt die Wirkung der Salbe während der gesamten Anwendung erhalten.

### Wie wird Onyster® angewendet?



#### 1.) Tag 1 - Tag 21:

Tragen Sie die Salbe 1x täglich auf den gesamten Nagel auf.



#### 2.) Tag 1 - Tag 21:

Lösen Sie die Schutzfolien (vier Teile) vom Pflaster und setzen Sie das Pflaster wie abgebildet auf den Nagel. Achten Sie darauf, dass das Pflaster gut abschließt.



#### 3.) ca. Tag 21:

Der aufgeweichte Teil des Nagels kann nun von Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt entfernt werden.



#### Tag 1 - Tag X\*

eventuell gleichzeitige Tablettenkur

\* Ihre Ärztin / Ihr Arzt wird die für Sie individuell notwendige Behandlungsdauer (ca. 3 Monate) festlegen.

- Tragen Sie die Salbe einmal täglich auf den erkrankten Nagel auf. Bedecken Sie hierbei die gesamte Nagelfläche.
- Danach kleben Sie das Pflaster vollständig über den mit Salbe bedeckten Nagel: zunächst in der Mitte und vorne über die Zehenkuppe, dann auf den beiden Seiten (vgl. Abbildung). Der zu behandelnde Nagel bleibt nun so 24 Stunden bedeckt.
- Wechseln Sie das Pflaster täglich: Bevor ein neues Pflaster zur Anwendung kommt, müssen die alten Sal-

benreste entfernt werden, erst dann darf neue Salbe aufgetragen und ein neues Pflaster verwendet werden.

- Je nach Ausmaß des Pilzbefalls dauert die Behandlung 1 bis 3 Wochen.
- Nach dieser Behandlungsdauer wird Ihre Ärztin / Ihr Arzt den aufgeweichten Teil des Nagels ohne großen Aufwand entfernen können.
- Wenn Ihre behandelnde Ärztin / Ihr behandelnder Arzt aufgrund seiner Erfahrung der Meinung sein sollte, dass eine gleichzeitige Behandlung Ihres Nagelpilzes mit Tabletten sinnvoll ist, sollten beide Behandlungen gleichzeitig begonnen werden. Die „Tablettenkur“ muss aber über ca. 3 Monate durchgeführt werden. Durch die Anwendung von Onyster® und die damit verbundene Entfernung der befallenen Nagelpartien kann die Tablettenbehandlung noch besser zur Wirkung gelangen.

### Was muss man bei der Anwendung von Onyster® noch beachten?

- Wenden Sie Onyster® nicht auf verletzter bzw. geschädigter Haut an!
- Bringen Sie Onyster® nicht in die Nähe der Augen und wenden Sie es auch nicht auf Schleimhäuten an.
- Waschen Sie nach der Anwendung sofort gründlich Ihre Hände!
- Bei einer Überempfindlichkeitsreaktion brechen Sie die Behandlung ab und wenden Sie sich an Ihre Ärztin / Ihren Arzt.
- Lagern Sie Onyster® nicht über 30°C.

[www.pelpharma.at](http://www.pelpharma.at)